

Glivec

Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetssygehus

Indledning

Vi håber, at denne patientinformation kan være en hjælp til at få et overblik over, og viden om den behandling, du har fået anbefalet.

Dine pårørende kan også have glæde af at læse patientinformationen for bedre at kunne støtte dig i behandlingsforløbet. Inden behandlingen starter, vil du også blive informeret mundtligt om behandlingens virkning og bivirkninger.

Behandling med Glivec®

Glivec® anvendes til behandling af kronisk myeloid leukæmi, CML. Desuden kan Glivec® benyttes som supplement til behandling af andre sjældne blodsygdomme, herunder en sjælden undertype af akut lymfatisk leukæmi, Philadelphia-kromosom positiv ALL.

Sådan virker Glivec®

Glivec® virker især ved sygdomme med det såkaldte Philadelphia kromosom. Glivec® er målrettet mod at blokere funktionen af et protein, som i de syge celler er overaktivt (Philadelphia-kromosom-positive celler), og derfor bliver der dannet alt for mange hvide blodlegemer. Hæmningen af dette energiprotein medfører, at der ikke længere kan dannes for mange hvide blodlegemer. Det vil sige at knoglemarvsfunktionen igen bliver normal, og at sygdommen dermed holdes nede. Virkningen holder kun så længe der gives medicin.

Sådan tages Glivec®

Glivec® skal som regel indtages én gang om dagen, på samme tid hver dag, sammen med et måltid og et stort glas vand, for at mindske bivirkninger fra mavetarmkanalen. Tabletterne må ikke knuses. Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice under behandling med Glivec®, da det øger mængden af medicinen i kroppen. Hvis du er i tvivl om hvordan du bedst tager medicinen, skal du endelig spørge sundhedspersonalet.

Effekten af Glivec® kan påvirke og påvirkes af andre lægemidler og naturlægemidler. Du bør derfor tale med din kontaktlæge, før du evt. starter ny medicin.

Glivec® udleveres af personalet på afdelingen.

Graviditet

For kvinder i behandling med Glivec® skal der tages særlige hensyn ved graviditet eller amning.

Behandlingsforløbet

Behandling med Glivec® er næsten altid meget effektiv. Men, som vi forstår det i dag, forsvinder sygdomsanlægget ikke helt, og du skal derfor formentlig være i behandling resten af dit liv.

Du kan i løbet af kort tid genoptage dit sædvanlige liv, dog med de forandringer, som kronisk sygdom medfører.

Du skal jævnligt have taget blodprøver og møde til ambulant kontrol, for at få vurderet om din behandling fortsat er effektiv, og om der evt. er bivirkninger. Nogen gange kan de Philadelphia-kromosom-positive celler udvikle ufølsomhed (resistens) over for medicinen. Så kan det blive nødvendigt at ændre behandling.

Bivirkninger til behandlingen

Bivirkninger er utilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne men kan være alvorlige.

Tal med personalet, hvis du oplever bivirkninger under behandlingen. Din læge og sygeplejerske kan hjælpe dig med at lindre disse bivirkninger. Hvis bivirkningerne er alvorlige, kan din læge nedsætte dosis, afbryde behandlingen midlertidigt eller vælge et alternativt præparat.

De mest almindelige bivirkninger vil blive nævnt i det følgende afsnit.

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte personalet, eller

du kan selv hente oplysninger på
www.medicin.dk eller
www.indlaegsseddel.dk

Bivirkninger ved Glivec®

Bivirkninger til Glivec® er ofte milde til moderate, og medfører sjældent, at behandlingen må stoppe. De hyppigste bivirkninger er kvalme, diarre, udslæt, væskeophobning omkring øjne og i kroppen, øjengener, muskel-kramper og -smerter, hovedpine, træthed.

Påvirkning af blodcellerne

Glivec® påvirker også den raske knoglemarv, hvor dine blodceller dannes. Det er som regel uden betydning, men hvis det sker, kan det give blodmangel, mangel på hvide blodlegemer eller mangel på blodplader. De hvide blodlegemer er vigtige i kroppens forsvar mod infektioner.

Infektion

Du har lidt øget risiko for at få infektioner, mens du er i behandling med Glivec®.

Kontakt ALTID afdelingen

Du skal altid kontakte afdelingen, hvis du oplever nedenstående problemer.
Du skal især være agtpågivende, hvis et problem opstår ret pludseligt og ikke

- Feber, 38°C eller derover
- Blødning, som ikke standser af sig selv
- Stærke smerter
- Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
- Åndenød eller stakåndethed
- Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
- Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre

forsvinder af sig selv – hvis du oplever nogle gener, du ikke er vant til at have:

- Udslæt
- Forstoppelse igennem flere dage
- Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
- Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
- Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
- Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme

Telefonnumre

Hæmatologisk Afdeling: 4732 4800,
hverdag mellem 08-15

Hæmatologisk akuttelefon: 4732 4886,
mellem 15 og 08

Med venlig hilsen

Personalet

Hæmatologisk Afdeling