

Graviditetskvalme og subkutant kateter



REGION SJÆLLAND

HOLBÆK SYGEHUS

-vi er til for dig



Kvalmestillende behandling via subkutan kateter

Nogle gravide får ikke gavn af den medicinske behandling som tablet grundet de hyppige opkastninger. Derfor kan man vælge at anlægge en subkutan kateter og give kvalmestillende medicin heri. Du kan selv administrere den kvalmestillende medicin i et subkutan kateter der hjemme.

Hvad er en subkutan adgang?

- Et tyndt plastikkateter, som placeres lige under huden.
- Placeringen vil typisk være på overarmen.
- På det tynde plastikkateter er der tilkoblet en slange, hvorigennem den kvalmestillende medicin gives.

Hyperemesis ambulatoriet

I hyperemesis ambulatoriet vil jordemoderen stå for anlæggelse og udskiftning af det subkutane kateter, samt oplære dig i håndtering og anvendelse heraf.

Du vil fortsat gå til kontrol i hyperemesis ambulatoriet to gange ugenligt, hvor jordemoderen vil udskifte kateteret og tage stilling til den fremadrettede behandling.

Håndhygiejne og administration af kvalmestillende medicin

God håndhygiejne er vigtigt forud for håndtering af den kvalmestillende medicin, samt udskiftning af plaster. Husk derfor BÅDE

håndvask og afspritning af hænder inden administration af medicin i kateteret.

Afsprit studsene i kateteret, administrer den kvalmestillende medicin og skyl herefter med lidt saltvand.

Hvor ofte medicinen administreres aftaler du med jordemoderen eller lægen.

Tegn på infektion

Du skal være opmærksom på tegn på infektion ved indstiksstedet:

- Rødme, varme, irritation, ømhed, smerte eller hævelse af huden omkring indstiksstedet.
- Feber.

Hvis du oplever en eller flere af ovenstående tegn, kan du let tage kateteret af eller kontakte barselsafsnittet.

Hygiejne og bad

Du må gerne gå i brusebad, da kateteret dækkes med et vandtæt plaster.

Karbad, svømmehal, havbad og lignende frarådes, grundet risiko for at plasteret opløses og det øger risikoen for infektion.



Kateter placeret på overarmen.



Ved tegn på infektion fjernes kateteret let ved at trække plasteret af.



Før administration af medicin afsprittes den blå studs.



Ved administration af medicin og saltvand fastgøres sprøjten ved at trykke sprøjten mod den blå studs.

Kontakt:

Ved spørgsmål angående din behandling kontakt da hyperemesis ambulatoriet:

Mandag og torsdag

Kl. 7.30-14.30

Telefon: 59484259

Ved behov for akut henvendelse kontakt fødeafsnittet eller barselsafsnittet.

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60

Fødeafsnittet 05-3

Telefon 59484293

Barselsafsnittet 06-3

Telefon: 59484300/59484302

www.holbaeksygehus.dk