



Phimosi (forhudsforsnævring) - behandling med Diproderm


Behandling af forhudsforsnævring

I skal anvende Diproderm creme 0,05%. Cremen påsmøres 2 gange dagligt i 4 uger. Forhuden strammes let op, så den forsnævrede del af forhuden ses tydeligt. Herefter påsmøres cremen i et tyndt lag fra spidsen af forhuden til der, hvor kanten af penishovedet tegnes gennem forhuden. Efter 1 uges behandling, trækkes forhuden gradvist længere og længere tilbage. Dette skal ske minimum 2 gange dagligt.

Husk at forhuden altid skal trækkes tilbage på plads, så hævelse af penishovedet og forhuden undgås. Denne hævelse vil kunne hindre forhuden i at komme tilbage på plads. Undgå at smøre creme på penishovedet eller på egne eller barnets fingre. Brug evt. handsker eller vask hænderne før og efter påsmøring.

Efter 4 ugers behandling skal resultatet vurderes. Vi vil derfor bede jer kontakte sygeplejersken på tlf. 59 48 42 15 tast 2. Telefонтid mandag, onsdag, torsdag og fredag mellem kl. 08.30-10.00. Man kan behandle med creme i yderligere 4 uger eller hvis forhuden stadig er generende snæver, vil jeres barn blive henvist til operation.

påsmør creme her



Hvorfor bruge binyrebarkhormoncreme?

Det er ved flere undersøgelser påvist, at man ved behandling med denne creme kan undgå operation hos drenge med forhudsforsnævring. 70-80 % opnår et tilfredsstillende resultat. De samme undersøgelser har også vist, at der ikke er bivirkninger ved behandlingen. brugen af binyrebarkhormonet påvirker ikke børnenes egen hormonproduktion.

Holbæk Sygehus, Børne- og Ungeafdelingen, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 4200