



Behandling med Ocrevus (Ocrelizumab)

Ocrevus (ocrelizumab) er et kunstigt fremstillet antistof, som ødelægger nogle af de hvide blodceller, der er af betydning for aktivering af immunsystemet og dannelsen af antistoffer. Behandling med Ocrevus har en kraftig, sygdomsdæmpende effekt ved multipel sklerose.

Hvornår anvendes Ocrevus

Ocrevus anvendes særligt, hvis man har attackvis sklerose med høj sygdomsaktivitet, men ikke tidligere har fået forebyggende sklerosemedicin, eller hvis man har haft sygdomsaktivitet på en anden forebyggende behandling.

Undersøgelse før opstart af Ocrevus

Ocrevus svækker immunforsvaret. Det er derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på, om du har kroniske infektioner eller tendens til alvorlige infektioner.

Før behandlingen skal der foreligge svar på forskellige blodprøver, herunder for smitsom leverbetændelse, Varicella Zoster, tuberkulose og HIV.

Du må ikke have infektion når du skal modtage behandling med Ocrevus.

Behandling med Ocrevus

Ocrevus gives som en subkutan injektion i maven. Behandlingen gives som udgangspunkt 2 gange om året med minimum 6. måneders interval.

Inden hver behandling med Ocrevus skal der tages kontrolblodprøver, tidligst 1 måned før behandlingsdatoen.

For at forebygge bivirkninger får du udleveret binyrebarkhormon, paracetamol og antihistamin, som udleveret og tages når du møder op i ambulatoriet.

Inden Ocrevus gives kontrollerer sygeplejersken blodtryk, puls og temperatur.

Bivirkninger

Når Ocrevus gives kan kroppen reagere ved at frigive nogle stoffer, som kan udløse feber og allergi-lignende gener. Der kan forekomme kvalme, feber, kulderystelser, diarré, træthed, hovedpine, ledsmerter, kløe, rødme og let hævelse omkring indstikssted, og hævelse i ansigt.



Da behandlingen dæmper immunsystemet, er der let øget tendens til at få både milde og mere alvorlige infektioner. Niveauerne af antistoffer i blodet kan falde efter nogle års behandling, og det kan give øget infektionstendens.

Undersøgelser under behandlingsforløbet

Der foretages en MR-skanning efter 3-6 måneders behandling (Rebaseline scanning) og herefter årligt eller afhængigt af behov. Du bliver regelmæssigt indkaldt til lægeundersøgelse. Der skal tages blodprøver inden hver behandling.

Graviditet og amning

Du må ikke behandles med Ocrevus under graviditet. Det anbefales at du bruger effektiv prævention i 4 måneder efter sidste injektion med Ocrevus

Amning er ifølge EMA acceptabelt hvis behandlingen startes få dage efter amningen er etableret. Hvis der gives præ-medicin bør amning udskydes 2-4 timer efter indtag af præ-medicin.

Vaccination

Der skal tages stilling til, om du har behov for andre vaccinationer, da effekten af vacciner er nedsat under behandling. Levende svækkede vacciner (f.eks. mod gul feber), må ikke gives mindre end 4 uger før behandlingsstart og under behandling med Ocrevus.



Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål:

Neurologisk Ambulatorium, Sjællands Universitetshospital Roskilde,
Vestermarksvej 11,
4000 Roskilde

Sekretær:

Telefon: +45 47 32 28 00

Telefontid: mandag – torsdag kl. 9- 15 og fredag kl. 09 – 14

Sklerosesygeplejerske:

Telefon: +45 47 32 28 00

Vælg 1 for ambulatorium

Vælg 2 for sygeplejerske

Vælg 2 for sklerose

Telefontid: mandag, onsdag og fredag mellem kl. 9 – 10

Min Sundhedsplatform

På [hjemmesiden www.minsundhedsplatform.dk](http://www.minsundhedsplatform.dk) eller appen MinSP på din smartphone kan du blandt andet følge med i din behandling, se kommende aftaler, melde afbud, se prøvesvar og udfylde spørgeskemaer. Hvis du har spørgsmål til din behandling, kan du også skrive direkte til os.