



Spacerbehandling – Astmatisk bronkit

Behandlingsplan ved hjælp af spacer

Forebyggende medicin

Mindsker hævelse og betændelse i luftveje. **Skal tages hver dag.** Optimal effekt efter 10 - 14 dage.

Spray Flixotide® Findes i 50 - 125 - 250 mikrogram / dosis. _____mikrogram per pust.

_____ pust x _____ daglig i _____ dage.

Vejledning i anvendelse

Tages før måltid. **Ryst medicinen før hvert pust.** Hvert pust efterfølges straks af **5 – 6** indåndinger i spaceren. Se i øvrigt vejledning i medicinpakken. Husk at børste tænder, skylle mund og tørre ansigtet med en våd klud for at hindre svamp og hud irritation.

Akut behandling

Symptomer ved forværring: Tiltagende hoste også om natten, pibende/hvæsende, hurtig besværet vejrtrækning.

Spray Airomir® / Ventoline® mg per pust:

4 pust hver 20. minut inden for en time (dvs. 16 pust på en time).

☐ Herefter 2 pust hver time.

☐ Herefter 2 pust hver 2. time.

☐ Herefter fast hver 3. time i 2-3 dage (som beskrevet ovenfor).

VIGTIGT

Er der ikke effekt indenfor 1-2 timer, eller barnet bliver tiltagende dårligt, eller får feber, skal egen læge/vagtlæge kontaktes.

Almindelige bivirkninger ved Flixotide (inhalationssteroid) er svamp i mund, hoste, hæshed.

Bivirkning ved Ventoline er: Rysten på hænderne og hurtig puls.

Særlige aftaler:

Tvivlspørgsmål

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte sygeplejersken i Børne- og Ungeafdelingen.

Børne- og Ungeambulatoriet afsnit 04-3

man-ons-tor-fre kl. 08.30-10.00 og

Dag: tlf. 59 48 42 15 Tast 1

Børne- og Ungeafdeling 05-2

Dag: tlf. 59 48 42 38

Børne- og Ungemodtagelsen 08-2

Aften: tlf. 59 48 42 33

Børne- og Ungeafdelingen

Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60

4300 Holbæk

Tlf. 59 48 42 00