

Opstart med MTX



Børnefoto

REGION SJÆLLAND
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS HOSPITAL



- vi er til for dig

MTX

MTX dæmper immunsystemets aktivitet. En begyndende effekt kan forventes i løbet af 4-8 uger og max effekt efter 12 uger.

Du skal tage MTX én gang om ugen - gerne på en fredag eller lørdag.

Ved behandling med MTX vil der i løbet af måneder ske et fald i kroppens **folinsyre** (et B-vitamin), derfor suppleres MTX behandling med folinsyre tabletter.

Folinsyre tabletten tages en gang om ugen, og ikke samme dag som MTX, men 1 dag før eller efter. Folinsyre kan være med til at mindske eventuelle bivirkninger.

Hvis du får kvalme efter at have taget MTX, kan du tage kvalmestillende medicin. Den virker i løbet af en halv time og virkningen holder ca. 12 timer.

Du må tage max. to kvalmestillende tabletter i døgnet.

Hvis du oplever kvalme flere gange, kan du med fordel tage kvalmestillende medicin en halv time før du taget MTX.

MTX og kvalmestillende (ondansetron/zofran) udleveres fra sygehuset.

Folinsyre bliver der lavet en recept på og den skal hentes på apoteket.

Der skal tages blodprøver en måned efter opstart af behandling. Herefter skal der tages blodprøver før kontrol i reumatologisk ambulatorium typisk hver 3. måned.

Du kan altid ringe i telefontiden eller skrive i MIN SP, hvis du har spørgsmål.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til behandlingsforløbet, så kan du kontakte Børn- og Ungeambulatoriet som følgende;



Læge:

Der kan træffes aftale om telefonkonsultation ved kontakt til sekretæren eller sygeplejersken.

Sygeplejerske:

Telefontid på 5855 3469
Tirsdage kl. 08-09
Onsdage kl. 08-09
Fredage kl. 08-10

Lægeseekretær:

Ring til os
Tlf. 5855 3400
Mandag – fredag kl. 08.00 – 12.00
Mandag – fredag kl. 12.00 – 15.00
(Akutnummer oplyses på telefonsvarer)



Midt- og Vestsjællands Hospital, Slagelse
Børn- og Ungeambulatoriet
Fælledvej 2C
4200 Slagelse