

Hvis du har blodtypeantistoffer



REGION SJÆLLAND

HOLBÆK SYGEHUS



-vi er til for dig

Alle gravide får, ved 1. graviditetsundersøgelse hos egen læge, taget en blodprøve til blodtypebestemmelse og undersøgelse for blodtypeantistoffer.

Hvad er en blodtype?

Blodtyper er særlige markører, som findes på overfladen af de røde blodlegemer. De mest kendte blodtypesystemer er ABO og Rhesus (RhD), men der findes mere end 100 forskellige blodtypesystemer.

Blodtyperne er arvelige - og alle mennesker arver halvdelen fra moderen og halvdelen fra faderen. Fostret kan således have en anden blodtype end sin mor.

Hvorfor dannes antistoffer?

Hvis immunsystemet kommer i kontakt med en fremmed blodtype, kan det reagere ved at danne antistoffer mod denne blodtype (immunisering).

Hvis du tidligere har været udsat for en anden blodtype, fordi en smule blod er trængt over i din blodbane, danner dit immunforsvar antistoffer mod »det fremmede«. Disse antistoffer er nu i dit blod.

Antistofferne kan være dannet, hvis du tidligere:

- Har aborteret

- Har fået blodtransfusion
- Har været gravid
- Har født

Betydningen for din graviditet

Antistofferne kan trænge over i fostrets blod. I langt de fleste tilfælde betyder det ingenting. I enkelte tilfælde kan antistofferne ødelægge fostrets røde blodlegemer og derved forårsage blodmangel hos barnet. Desuden har barnet øget risiko for at udvikle gulsot efter fødslen. Vi tilbyder derfor løbende kontrol og behandling.

Kontrol

Kontrollen varierer afhængig af mængden og typen af antistof.

Kontrollen kan omfatte:

- Ekstra blodprøver
- Blodprøve fra faderen
- Eventuelt samtale med en læge i Svangreambulatoriet
- Eventuelt ekstra skanning for at se, om barnet udvikler tegn på blodmangel
- Eventuelt tættere kontrol af barnet i dagene efter fødslen for at se, om barnet udvikler gulsot i en grad, der kræver lysbehandling

Blodprøver kan tages på et andet sygehus i regionen, hvis det passer dig/jer bedre. Se link til

adresser bagerst i denne information.

Formålet med kontrollen under graviditeten er:

- At undersøge, om antistoffet udgør en risiko for barnet
- At følge udviklingen i mængden af antistof

Behandling

Hvis mængden af antistoffer stiger kraftigt, kan det være nødvendigt at sætte fødslen i gang før tiden.

Hvis der er den mindste mistanke om, at fostret kan få blodmangel, bliver I henvist til Rigshospitalet.

Hvis barnet bliver født med lav blodprocent, kan det få udskiftet blodet kort efter fødslen. I ganske få tilfælde kan det være nødvendigt at give fostret blod inden fødslen.

Praktiske oplysninger

- Kontakt svangreambulatoriet hverdage mellem 9.00 og 15.00, hvis du/I har spørgsmål
- Ring i god tid, hvis du ønsker at melde afbud eller ændre tidspunktet for blodprøver eller anden kontrol
- Kom i god tid, hvis du skal parkere
- Medbring din vandrejournal

Blodprøvetagning foregår på Klinisk Biokemisk Afdeling på alle sygehuse i regionen.

Se adresser, telefonnumre, åbningstider og tidsbestilling på <http://www.regionsjaeland.dk/sundhed/blodproever-ekg-roentgen-og-skanning/blodproever-og-ekg>

Med venlig hilsen

**Jordemødre og læger
Holbæk sygehus**

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60

Svangreambulatoriet 06-4

Telefon 59484320 ml kl. 9-15

Fødeafdeling 05-3

Telefon 59484293

Barselsafdeling 06-3

Telefon: 59484300/59484302

www.holbaeksygehus.dk

Rev. 04.04.25/ SMR