



Undersøgelse for penicillinallergi

Jeres barn har haft en reaktion ved indgivelse af penicillin, der kan tolkes som penicillinallergi. De fleste reaktioner, der ligner allergi, viser sig som udslæt, men oftest er det sygdommen og ikke den indgivne penicillin, der er årsag til udslættet.

Almindelig penicillin er det bedste antibiotikum til mange infektioner. Derfor er det vigtigt at afklare, om barnet tåler penicillin.

Kontakt til afdelingen

Hvis jeres barn har feber eller andre sygdomme op til indlæggelsen, bedes I kontakte sengeafsnit 05-2 på tlf. 59 48 42 30 kl. 09.00 - 14.00.

Medbring ved indlæggelse selv mad og drikke til den forældre, der er med, da dagen kan blive lang (mad kan også købes i kiosken ved Hovedindgangen).

Børne- og Ungeafdelingen
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Undersøgelsen består af 2 trin:

1.

Jeres barn skal have taget blodprøve for penicillinallergi senest 4 uger før provokationen, enten på Børne- og Ungeafdelingen eller hos jeres egen læge. Hvis blodprøven tydeligt viser en reaktion på penicillin, har jeres barn penicillinallergi, og der skal ikke foretages yderligere undersøgelser. Hvis blodprøven er negativ, indkaldes jeres barn til undersøgelse under indlæggelse.

2.

Indlæggelse på Børne- og Ungeafdelingen varer ca. 5 timer. Der gives penicillin 2 gange i stigende doser. Hvis der ikke kommer udslæt, kan jeres barn tåle penicillin. Inden I bliver udskrevet, vil I få at vide, om jeres barn kan tåle penicillin eller ej. Jeres egen læge får besked om dette.