


Urinvejsinfektion

Børne- og Ungeambulatoriet



REGION SJÆLLAND

HOLBÆK SYGGEHUS

- vi er til for dig



Sygdommen kan vise sig som infektion i blæren eller i nyrebækkenet. Infektionen skyldes bakterier, evt. fra barnets tarm, der breder sig gennem urinrøret til blæren og evt. nyrebækkenet..

For at stille diagnosen »urinvejsinfektion« skal der tages 2 prøver af steril (ren) urin fra barnet. Urinen skal være en **midtstråleurin** og skal opsamles i sterilt bæger og være fra to forskellige vandladninger. Urinposer eller afkogte »rengjorte« syltetøjsglas og lignende må **ikke** anvendes til formålet.

Symptomer

Symptomerne afhænger af alder og varierer fra barn til barn.

Børn fra 0-1 år vil ofte have gylp, evt. tiltagende gylp, opkastninger, være pirrelige og have grædeture. Urin/ble kan lugte kraftigt.

Børn fra 1-3 år klager tit over mavesmerter eller smerter omkring kønsorganerne. Børnene kan være pirrelige, i dårligt humør og have grædeture - også om natten. De kan være irriterede ved bleskifte. Urin/ble kan lugte kraftigt.

Feber over 38,5° kan være et tegn på nyrebækkenbetændelse, og kræver henvisning til læge.

Børn fra 3 års alderen kan have ét eller flere af de ovennævnte symptomer på blærebetændelse eller: smerter ved vandladning, hyppig tisse-trang, blod i urinen, urininkontinens og evt. ildelugtende urin.

Hvornår skal man søge læge?

Når barnet har ét eller flere af ovennævnte symptomer, bør man søge læge. Feber med eller uden mavesmerter kan i 20-30 % af tilfældene skyldes urinvejsinfektion. Man bør også søge læge, hvis barnet har meget ildelugtende urin.

Behandling og varighed

Blærebetændelse behandles med medicin i form af tabletter eller mikstur.

Behandles i 5-10 dage.

Nyrebækkenbetændelse behandles med medicin i form af tabletter eller mikstur. I nogle tilfælde gives medicinen i en blodåre via et drop.

Denne behandling kræver indlæggelse på Børne-og Ungeafdelingen i op til 10 dage for børn under 1 år.

Undersøgelser

Der bliver altid tilbudt en skanning med ultralyd af nyrer og blære. Afhængig af sygdommens sværhedsgrad og evt. fund ved ultralydsskanningen kan man supplere med andre undersøgelser.

Forebyggelse

- Rigelig væske
- Børn fra 5-10 kg bør drikke 100 ml/kg, altså 0,5 til 1 liter daglig.
- Børn på 10-20 kg bør drikke 500 ml +50 ml/kg, altså 1 til 1,5 liter daglig.
- Børn på over 20 kg bør drikke 1000 ml + 20 ml/kg, altså over 1,4 liter hver dag.
- Barnet skal helst drikke rigelig fordelt på hele dagen
- Piger, der er seksuelt aktive, bør efter samleje huske at tisse.

Husk ved toiletbesøg

- Daglig afføring.
- Give dig god tid ved alle toiletbesøg.
- At lade vandet 5-7 gange om dagen.
- For piger – korrekt tørre teknik.

Børne – Ungeambulatoriet.

Holbæk sygehus.

Tlf. 59 48 42 15

Alle hverdage fra 9 – 15.

D4-ID 682619, version 2.

