

The Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD)

Oversat af cand. psych. Leif Lindskov Pedersen efter: Prins et al., 2003 & 2004

Spørgsmålene stilles ved indledningen til den diagnostiske samtale eller som en del af denne.

Besvarelsene kan give et fingerpeg om en mulig PTSD-diagnose.

Spørgsmål

Har du i dit liv haft en oplevelse, der var så skræmmende, forfærdelig eller rystende, at du i den seneste måned

1. Har haft mareridt om oplevelsen eller tænkt på den, når du ikke ønskede det?

JA/NEJ

2. Har anstrengt dig for ikke at tænke på oplevelsen eller været nødt til at undgå situationer, der mindede dig om den?

JA/NEJ

3. Hele tiden har været vagtsom, årvågen eller haft let ved at fare sammen, selv ved små sanseindtryk?

JA/NEJ

4. Har følt dig ufølsom (uden følelse) eller fremmed og uengageret i forhold til andre, til aktiviteter eller til dine omgivelser?

JA/NEJ

Hvis 3 eller flere spørgsmål besvares med 'ja', er diagnosen PTSD en mulighed.

Referencer

1. Prins, A., Ouimette, P., Kimerling, R., Cameron, R. P., Hugelshofer, D., Shaw-Hegwer, J., Thrailkill, A., Gusman, F. D., Sheikh, J. I. (2003): The primary care PTSD screen (PC-PTSD): development and operating characteristics. *Primary Care Psychiatry, 9*, 9-14
2. Prins, A., Ouimette, P., Kimerling, R., Cameron, R. P., Hugelshofer, D. S., Shaw-Hegwer, J., Thrailkill, A., Gusman, F. D., Sheikh, J. I. (2004). The primary PTSD screen (PC-PTSD): Corrigendum. *Primary Care Psychiatry, 9*, 151