



Behandling med Briumvi (Ublituximab)

Briumvi (Ublituximab) er et kunstigt fremstillet antistof, som ødelægger nogle af B-cellerne, de hvide blodceller. B-celler er af betydning for aktivering af immunsystemet og dannelsen af antistoffer. Behandling med Briumvi har en kraftig, sygdomsdæmpende effekt ved multipel sklerose.

Hvornår anvendes Briumvi

Briumvi anvendes særligt, hvis man har attakvis sklerose med høj sygdomsaktivitet, men ikke tidligere har fået forebyggende sklerosemedicin, eller hvis man har haft sygdomsaktivitet på en anden forebyggende behandling.

Undersøgelse før opstart af Briumvi

Briumvi svækker immunforsvaret. Det er derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på, om du har kroniske infektioner eller tendens til alvorlige infektioner. Før behandlingen skal der foreligge svar på forskellige blodprøver, herunder for smitsom leverbetændelse, Varicella Zoster, tuberkulose og HIV.

Du må ikke have infektion når du skal modtage behandling med Briumvi.

Dosering

Briumvi gives som infusion i en blodåre (IV)

Ved IV Briumvi gives først 2 infusioner med minimum 2 ugers mellemrum og herefter gives en infusion hver 6. måned. Første infusion tager ca. 4 timer, efterfølgende infusion tager ca. 1 time. Ved de to første behandlinger skal du blive 1 time til observation. Herefter kan observation undlades hvis der ikke har været nogle reaktioner.

Inden hver behandling med Briumvi skal der tages kontrolblodprøver, tidligst 1 måned før behandlingsdatoen.

For at forebygge bivirkninger får du udleveret præmedicin. Inden behandlingen starter får du binyrebarkhormon, paracetamol og antihistamin. Din sygeplejerske vil informere dig om hvornår det skal tages.

Under infusion kontrollerer sygeplejersken regelmæssigt puls og blodtryk.



Bivirkninger

Når Briumvi gives kan kroppen reagere ved at frigøre nogle stoffer, som kan udløse forbigående (typisk minutter til få timer) bivirkninger (kulderystelser, udslæt, rødmen i huden, åndenød, hoste, hjertebanken, hovedpine, kvalme, svimmelhed, feber, træthed, ledsmerter), som oftest kan ses efter første behandling med Briumvi. Ved efterfølgende behandlinger er hyppighed og intensitet af infusions-reaktioner typisk lavere, og alvorligere reaktioner er meget sjældne. For at forebygge bivirkninger gives præmedicin.

Da behandlingen dæmper immunsystemet, er der let øget tendens til at få både milde og mere alvorlige infektioner. Niveauerne af antistoffer i blodet kan falde efter nogle års behandling, og det kan give øget infektionstendens.

Undersøgelser under behandlingsforløbet

Der foretages en MR-skanning efter 3-6 måneders behandling (Rebaseline scanning) og herefter årligt eller afhængigt af behov. Du bliver regelmæssigt indkaldt til lægeundersøgelse. Der skal tages blodprøver inden hver behandling.

Graviditet og amning

Du må ikke blive gravid, mens du er i behandling med Briumvi. Du må tidligst blive gravid 4 måneder efter endt Briumvi. Du skal bruge sikker prævention.

Det er ukendt om Briumvi udskilles i modermælken, vi anbefaler ikke at du ammer mens du er i behandling med Briumvi.

Vaccination

Der skal tages stilling til, om du har behov for andre vaccinationer, da effekten af vacciner er nedsat under behandling. Levende svækkede vacciner (f.eks. mod gul feber), må ikke gives mindre end 4 uger før behandlingsstart og under behandling med Briumvi.



Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål:

Hjerne- og Nervesygdomme, Sjællands Universitetshospital Roskilde,
Vestermarksvej 11,
4000 Roskilde

Sekretær:

Telefon: +45 47 32 28 00

Telefontid: mandag – torsdag kl. 9- 15 og fredag kl. 09 – 14

Sklerosesygeplejerske:

Telefon: +45 47 32 28 00

Vælg 1 for ambulatorium

Vælg 2 for sygeplejerske

Vælg 2 for sklerose

Telefontid: mandag, onsdag og fredag mellem kl. 9 - 10

Min Sundhedsplatform

På [hjemmesiden www.minsundhedsplatform.dk](http://www.minsundhedsplatform.dk) eller appen MinSP på din smartphone kan du blandt andet følge med i din behandling, se kommende aftaler, melde afbud, se prøvesvar og udfylde spørgeskemaer. Hvis du har spørgsmål til din behandling, kan du også skrive direkte til os.