

Behandling Med Pamifos



REGION SJÆLLAND
ROSKILDE SYGEHUS



Indhold:

Pamifos	3
Anvendelse	3
Hvordan virker Pamifos	3
Bivirkninger	3

Pamifos

Pamifos blandes med NaCl og gives som infusion over ½ time ved normal nyrefunktion, ellers over 2 timer. Behandlingen gives hver 4. uge i op til 24 måneder. Behandlingen kan gives ambulant.

Anvendelse

Pamifos hæmmer knoglenedbrydningen. Gives både forebyggende og som aktiv behandling af forhøjet calcium i blodet. Kan lindre knoglesmerter.

Hvordan virker Pamifos?

Pamifos hæmmer nedbrydningen af knoglerne, og dermed mindskes calcium-indholdet i blodet.

Den knoglestyrkende virkning indtræder efter måneders behandling. Pamifos kan ikke gives som tablet-behandling.

Bivirkninger

Temperaturforhøjelse

I døgnnet efter behandlingen med Pamifos kan optræde influenzalignende symptomer med let temperaturforhøjelse. Generne er almindeligvis harmløse og kan behandles med 1-2 tabletter paracetamol ved behov.

Andet

Det er vigtigt, at du indtager rigelig væske (2-3 l i døgnnet) og er fysisk aktiv både for at forebygge og behandle knogleskørhed.

Så længe calcium i blodet er forhøjet, må du ikke indtages D-vitamin og kalktilskud med kosten – spørg lægen ved tvivl.

Det er vist at behandling med Pamifos i sjældne tilfælde kan give anledning til en betændelsestilstand i kæben.

Kontakt **ALTID** afdelingen

Du skal altid kontakte afdelingen, hvis du oplever gener i forbindelse med din behandling, du ikke er vant til.

Du skal især være agtpågivende, hvis et problem opstår ret pludseligt og ikke aftager eller forsvinder af sig selv.

Telefonnumre

Hæmatologisk Afdeling: 4732 4800, hverdage mellem 8-15

Hæmatologisk akuttelefon: 4732 4840, mellem 15 og 8

Med venlig hilsen

Personalet

Hæmatologisk Afdeling