

Smertevarsel

Risiko for graviditet uden for livmoderen

Efter undersøgelsen på Holbæk sygehus, kan vi ikke udelukke, at du kan være gravid uden for livmoderen.

Ved graviditet uden for livmoderen, sidder graviditeten som oftest i æggelederen. Hvis graviditeten vokser kan æggelederen risikere at briste, og der kan komme blødning ud i bughulen. Det er en farlig tilstand, som kræver en hurtig behandling med akut operation.

Hvis æggelederen er ved at briste, får man som regel smerter i underlivet, ofte i den ene side. Undertiden kommer der skuldersmerter eller smerter ved afføring. Hvis der kommer en større blødning i bughulen, kan man blive utilpas og svimmel.

Det er vigtigt, at du kan få hjælp, hvis du pludselig bliver dårlig. Derfor bør du ikke være alene, indtil det er afklaret, om du er gravid inde i eller uden for livmoderen.

Hvis du får smerter i underlivet, eller bliver svimmel og utilpas, bør du straks kontakte sygehuset.

- Du kan ringe døgnet rundt til Holbæk Sygehus. I dagtid skal du kontakte Gynækologisk ambulatorium på 59 48 42 83 (hverdage kl. 8-15) øvrige tidsrum skal du kontakte Kirurgisk/Gynækologisk sengeafsnit på 59 48 43 55.

Hvis du bliver meget dårlig, skal du ringe **112** og tilkalde ambulance.

Vi kontakter dig, når der er svar på blodprøven og aftaler hér det videre forløb.