

Årsager

Storetåsknyster er hyppigere hos kvinder end hos mænd. Årsagen til lidelsen er formentlig et sammenspil af flere faktorer, hvor arv og skovalg (smalle, højhælede sko) spiller en afgørende rolle. Der findes dog også tilfælde, hvor man ikke kan påvise nogen årsag.

Symptomer

Kan være et eller flere af følgende: knystedannelse, smerter, hævelse og ømhed, rødme eller sår dannelse.

Diagnosen

Diagnosen stilles ud fra det kliniske billede samt røntgenbilleder.

Kirurgisk behandling

Under dette indgreb laves en stivgørende operation af rodledet til storetåen. Hensigten er at rette op på storetåens vinkling. Ofte er det nødvendigt at kombinere med yderligere en operation på storetåen. Dette vil du blive informeret om før operationen. Det har vist sig, at knysten i visse tilfælde gendanner sig.

Hvilken type operation, du vil blive tilbudt, afhænger af flere faktorer:

Blodforsyning, røntgenbilledets udseende og tærnes stilling er alle sammen faktorer, som er med til at bestemme lægens endelige beslutning om operationsmetode.

Operationsdagen

Inden operationen skal du tale med lægen, der skal operere dig. Selve operationen varer ca. 1 time.

Ved fuldbedøvelse bliver du først lagt til at sove, efter at sygeplejersken har sprittet og pakket din fod sterilt ind. Du får anlagt en manchete på benet for at forhindre blødning.

Efter operationen anlægges en stor forbinding, og du bliver kørt til opvågningsstuen.

Inden du tager hjem, kommer lægen og taler med dig.

Du får en Walkerstøvle på og krykkestokke med hjem.

Hjemme efter operationen

Du må ikke støtte på forfoden efter operationen i 6 til 8 uger. De første 2 uger må du ikke støtte på benet, og herefter må du støtte med gradvis stigende belastning. Du skal sove med støvlen på de første 3 uger.

Walkerstøvlen bevirker, at du kan træde på hele foden, uden at der kommer belastning på forfoden.

Du kan opleve, at foden hæver op. Dette kan du modvirke ved at lægge benet op, når du sidder eller hviler i løbet af dagen. Forbindingen skal skiftes, hvis den bliver løs, fugtig, snavset eller blødt igennem. Den skal skiftes i bund, og det kan foregå hos egen læge eller i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Ved brusebad kan benet og støvlen pakkes ind i en plasticpose.

Smerter efter operationen

Især de første dage efter operationen kan du have smerter i tåen. Der kan være ømhed og hævelse de første måneder efter operationen.

Ambulant opfølgning



Forbindingen skal skiftes efter 3-5 dage, og trådene skal fjernes efter 14 dage. Begge dele foregår i Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Efter trådene er fjernet, får du en ny bandage anlagt. Denne skal du bruge i 4 uger.

Endvidere skal du til kontrol i ambulatoriet 3 måneder efter operationen. Du vil blive undersøgt af en læge, og der vil igen blive taget røntgenbillede af din opererede fod.

Komplikationer

Som ved enhver anden operation ses i sjældne tilfælde infektion i såret. Man kan desuden af og til få lidt føleforstyrrelser på indersiden og oversiden af storetåen. I meget sjældne tilfælde ses manglende heling i knoglen. Hos enkelte bliver storetåen efter nogle år atter lidt skæv.

Man må påregne lidt nedsat bevægelighed i storetåens grundled efter operationen.

Arbejde

Det forventes, du kan genoptage arbejdet efter 2-3 måneder. Dette afhænger af hvilket job, du har.

Sport kan genoptages, når tåen ikke længere er øm. Ofte vil der gå op til 6 måneder, når det drejer sig om kontaktsport, f.eks. fodbold eller håndbold.

Med venlig hilsen

**Center for Planlagt Ortopædkirurgi
Næstved Sygehus**

Telefon: **56 51 41 82** alle hverdage mellem kl. 9-15.


Ved akutte problemer udenfor dette tidsrum skal du kontakte

vagtlægen: **70 15 07 00**

eller Region Sjællands akuttelefon: **70 15 07 08**

Center for Planlagt Ortopædkirurgi, version 2, maj 2019

Operation for Hallux Valgus (storetåsknyst) *Lapidus*



REGION SJÆLLAND
NÆSTVED SYGEHUS

- vi er til for dig