

Forstørret nyrebækken



Forstørret nyrebækken (pyelektasi)

Ved skanningen af nyrerne så vi, at fosteret havde et lidt forstørret nyrebækken. Det ses hos 1-4 ud af 100 fostre.

Et forstørret nyrebækken er ofte ikke farligt.

Hvad er årsagen?

Den hyppigste årsag til forstørret nyrebækken er, at der ophobes urin i nyrebækkenet. Allerede i fostertilstanden producerer nyrerne urin. Hvis der er tilbageløb af urin fra blæren op i urinlederen, så opstår der en op-hobning af urin i nyrebækkenet. I langt de fleste tilfælde er det uden betydning og skyldes, at nyrerne er umodne. Tilstanden forsvinder oftest af sig selv i løbet af graviditeten eller efter fødslen.

Skal det kontrolleres?

Vi tilbyder en kontrolskanning omkring din graviditetsuge 32, hvor vi hos de fleste finder, at forholdene er normale, og så er der ikke grund til yderligere undersøgelser.

Hvis der ved denne skanning fortsat ses et forstørret nyrebækken, anbefaler vi, at barnet bliver skannet igen af en speciallæge (føtalmediciner).

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte os i Svangreambulatoriet.

Med venlig hilsen

Personalet i Svangreambulatoriet,
Holbæk Sygehus

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Holbæk Sygehus

Smedelundsgade 60

Svangreambulatoriet 06-4

Telefon 59484320 ml. kl. 9-15

www.holbaeksygehus.dk