



Ditropan og Detrusitol

Forældreinformation

Behandling med Ditropan og Detrusitol

Ditropan og Detrusitol er præparater, som gives mod en overaktiv blære. Medicinen gives til børn med hyppig vandladning, hvilket ofte skyldes en overaktiv blære. Den overaktive blære får hele tiden mange nerveimpulser, der får blæren til at trække sig sammen. Hvis blæren kun trækker sig lidt sammen, føles det som vandladningstrang. Når blæren trækker sig helt sammen, starter vandladningen og kan næsten ikke stoppes ved viljens kraft.

Medicinen virker på blæremusklen, så den bliver mindre følsom for de nerveimpulser, der får den til at trække sig sammen. Det betyder, at der vil være færre vandladninger per dag. Forældreinformation Effekten af medicinen kan vurderes efter 2-4 uger, hvor der skal udfyldes et væske- vandladningsskema. Dette medbringes, når barnet kommer til kontrol i Børne- og Ungeambulatoriet.

Ved kontrollen udføres uroflow og blæreskanning. Dette er for at se, om medicinen giver anledning til dårlig blæretømning, som viser sig ved, at der vil være urin tilbage i blæren efter vandladning. Hvis medicinen virker efter hensigten, behandles i 3-6 måneder, og herefter holdes der pause. Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen genoptages i samråd med lægen.



Bivirkninger

Når man starter op med ny medicin, kan der være bivirkninger. Derfor skal I være opmærksomme på følgende: De almindeligste bivirkninger er tørhed i mund og øjne, forstoppelse, svimmelhed og hovedpine. Hvis medicinen virker alt for godt, er der risiko for, at man slet ikke kan lade vandet. Dette er en meget ubehagelig og smertefuld tilstand, som i værste fald skal afhjælpes med et kateter. I den situation skal barnet holde op med at tage medicinen og I skal søge læge/vagtlæge.

I bedes læse indlægssedlen, der udleveres på apoteket sammen med medicinen

Holbæk Sygehus, Børne- og Ungeafdelingen, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 4200