

Skift af JJ-kateter (Indvendigt kateter) I ambulatoriet i Roskilde

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Skift af JJ kateter i lokalbedøvelse

Forberedelse til undersøgelsen:

Hvis du inden for den sidste uge op til skift af JJ kateteret har mistanke om blærebetændelse, beder vi dig kontakte din egen læge med henblik på udredning og eventuel behandling. Hvis du har blærebetændelse, når du møder, kan vi *ikke* foretage skift af JJ kateteret, fordi infektionen kan blive spredt.

Proceduren foregår i lokalbedøvelse. Du må derfor spise og drikke som vanlig før operationen.

Har du sukkersyge, er det vigtigt, at du spiser, som du plejer.

Tag gerne 1 g Paracetamol 1 time før du skal møde.

Du skal møde i

Urologisk Ambulatorium 1. sal. [Henvendelse i sekretærlugen](#).

En sygeplejerske vil hente dig og gøre dig klar til proceduren.

Du skal blandt andet aflevere en urin prøve og der vil blive lagt et venekateter i en blodåre til forebyggende antibiotika.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du bliver placeret på et leje med tilknyttet røntgenudstyr.

Sygeplejersken vasker urinrørsåbningen og sprøjter derefter lokalbedøvende creme op i urinrøret. Proceduren foretages med et tyndt rør med lys og optik. Dette rør føres op i blæren gennem urinrøret og der fyldes saltvand i blæren. Herefter trækkes det gamle JJ kateter delvist ud og via det gamle JJ kateter anlægges en såkaldt guidewire til nyren. Det gamle kateter kan nu fjernes helt og der kan efterfølgende anlægges et nyt JJ kateter. Nogle patienter kan ind imellem føle jag eller ubehag fra nyren når guidewiren anlægges.

Proceduren er nu overstået.

Du vil blive indkaldt til nyt skift af JJ kateteret, typisk efter 6 mdr.

Sjællands
Universitetshospital
Urologisk Afdeling

Tlf: 4732 3535

Telefontider:
Ambulatoriet

Mandag – torsdag

Kl. 9 – 15

Fredag 9 – 14

Roskilde
Sygehusvej 6
4000 Roskilde

Ambulatorium, Roskilde
Opgang D, 1. sal

Næstved
Ringstedgade 61
4700 Næstved

Urologisk Afdeling og
Ambulatorium,
Afdeling 5 og 6
tlf. 56 51 30 60



God hygiejne

Bakterier og virus spreder sig let via hænderne. Vask dine hænder grundigt og brug håndsprit.

Efter undersøgelsen:

For at undgå blærebetændelse, bør du drikke rigeligt (2-3 liter) resten af dagen. Du kan få svie og lidt blødning ved de første vandladninger. Dette er ufarligt og forsvinder af sig selv i løbet af en dag eller to.

Komplikationer efter operationen:

Infektion:

Ved feber og kulderystelser, evt. i kombination med flankesmerter er det vigtigt du kontakter din læge eller lægevagten.

Ved flankesmerter eller nyopstået vandladningsgener efter JJ kateterskiftet skal du rette henvendelse til urologisk ambulatorium.

Med venlig hilsen
Urologisk Ambulatorium