



Skizofreni

Om lidelsen, dens symptomer og
veje til at komme sig



Historisk tilbageblik

Emil Kraepelin (psykiater) ”Dementia precox” i 1900-tallet

- Kronisk og fremadskridende, ”ungdomssløvsind”

Paul Eugen Bleuler (psykiater) ”Skizofreni” = *splittet sind*


- Splittelse i de emotionelle og intellektuelle funktioner

Kurt Schneider (psykiater)
”Førsterangssymptomer”

- Diagnosticering ift. andre psykoselidelser

Ætiologi og forekomst

- Livstidsrisiko ca. 2%
- Debut mellem 22-30 år
- Årsag ikke klarlagt blanding af arv og miljø
- Stress-sårbarhedsmodellen
- Strukturelle forandringer i hjernen





Symptomer

- **Bleuler**
- Grundsymptomer: ændring i følelsesliv, social tilbagetrækning, ambivalens, forstyrret tankevirksomhed og selvopfattelse, autisme
- Psykotiske symptomer: hallucinationer og vrangforestillinger



Symptomer


- **Positive symptomer** – noget sygdommen tilføjer
 - Psykotiske oplevelser
- **Negative symptomer** – noget sygdommen fjerner/hæmmer
 - eks. Evnen til at tale, komme i bad, være social, initiativ



Symptomer

- **Vrangforestillinger** – Forklaringer på den psykotiske verden
- Oplever sig forfulgt eller overvåget
- Oplever man har helt særlige evner eller formål
- Mistroisk, vred og bange

En forstyrret oplevelse af verden




Vi oplever verden gennem vores sanser – psykose kan ramme alle 5 sanser

En forstyrret oplevelse af verden




Ikke psykotisk verden - sanser det med ydre stimuli


En forstyrret oplevelse af verden




En forstyrret oplevelse af verden



En forstyrret oplevelse af verden



En forstyrret oplevelse af verden




Affektudbrudsmodellen

Bo Hejlskov Elvén

Psykotiske oplevelser som en slags stress signal

Som en radio der kan skrues op og ned



Veje til at komme sig

Klinisk recovery vs. Personlig recovery

Et forløb med skizofreni kan se meget forskellig ud fra person til person

Man siger ca....

1/3 slipper for symptomer



1/3 har forløb med tilbagefald



1/3 har et forløb med kontinuerlige symptomer



Veje til at komme sig

Er alvorligt men mange oplever at få et godt forløb og leve et liv med få eller ingen psykotiske episoder

Assertive Community Treatment (ACT)

Medikamentel behandling

Miljøterapi

Psykoedukation

Neurokognitiv træning

Social Færdighedstræning

Familieintervention

Psykoterapi

Og meget andet....



Accept og forandring

- Hjernens opmærksomhed som en lommelygte
- Hvad lyser den på?
- Du kan selv lære at flytte den
- Du er stadig dig selv
- Du er ikke alene



Accept og forandring

- At finde fred med sig selv
- Lærer at lytte til egne signaler
- Omsorg
- Sunde relationer
- Kreativitet

