

Behandling med Daratumumab

Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetssygehus

Velkommen til Hæmatologisk Afdeling.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske behandling med antistoffet **Darzalex®** (handelsnavn **Daratumumab**) og hvordan denne behandling kan påvirke dig.

Behandlingens virkning på din sygdom

Daratumumab er et monoklonalt antistof. Behandling med antistof kaldes **immunterapi**.

Antistoffer findes og dannes normalt i kroppen, hvor de udgør en del af vores immunsystem.

Monoklonale antistoffer er proteiner, som er designet til at genkende og koble sig fast på bestemte kræftceller. Daratumumab er et anti-CD38 antistof, der kobler sig til specielle CD38-proteiner, som findes på myelomatose cellerne og derved hjælper dit immunsystem med at finde og ødelægge dem.

Behandlingsforløbet

Daratumumab gives oftest ambulant og du kan derfor gå hjem samme dag.

Typisk gives behandlingen ugentlig de første 8 uger, hver 2. uge i 15 uger og derefter hver 4. uge på ubestemt tid. Informationen om dette får du ved samtale med lægen og sygeplejersken.

Daratumumab gives alene eller i kombination med kemoterapi.

Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, i tilfælde af at din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang.

En uge før hvert lægebesøg, skal der tages blodprøver medmindre du har andre aftaler med din læge.


Husk at bestil tid til blodprøvetagning på: www.blodproever.dk

Sådan gives behandlingen

Ved første behandling får du udleveret medicin (præ medicin), som skal tages **1 time før behandlingsstart**. Medicinen forebygger evt. allergisk reaktion og er følgende:

- **Tablet antihistamin** (modvirker allergisk reaktion).
- **Tablet binyrebarkhormon** (modvirker allergisk reaktion).
- **Tablet paracetamol** (modvirker feber).

Daratumumab gives som injektion i underhuden (subcutant) i mave regionen.



Første behandling tager ca. 4 timer (obs. der står 2 timer i din indkaldelse!).

Time 0: Præ medicin tages og sygeplejersken gennemgår virkning og bivirkninger til Daratumumab. Du får målt blodtryk, temperatur og iltmætning.

Time 1: Behandlingen gives over 3-5 min. De næste 2 timer sidder du til observation.

Time 2: Du får igen målt blodtryk, temperatur og iltmætning.

Time 4: Hvis du er velbefindende kan du gå hjem.

Du vil få udleveret præ medicin til næste behandling, som skal tages 1 time før du møder.

Såfremt du ikke har reageret på den første behandling, er det ikke nødvendigt at sidde til observation til de efterfølgende behandlinger.

Til de efterfølgende behandlinger er der afsat 1 time. Får du Daratumumab i kombination med anden behandling, kan den samlede tid i ambulatoriet godt være længere.

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke-tilsigtet virkninger af medicinen. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige.

Allergisk reaktion

Daratumumab kan give allergisk reaktion, såsom:

- Kulderystelser
- Ondt i halsen
- Hoste
- Kvalme
- Opkastning

- Kløende, løbende eller tilstoppet næse
- Stakåndethed eller andre vejrtrækningsproblemer

Mere udtalt allergisk reaktion kan være:

- Åndenød
- Hjertebanken
- Smerter i muskler og led
- Feber

Oplever du nogle af ovenstående reaktioner når du får Daratumumab, skal du straks sige til. Lægen og sygeplejersken vil vurdere om der skal gives medicin for at forebygge udvikling af reaktionen.

Du kan også få lokale bivirkninger i huden, der hvor behandlingen er givet:

- Ømhed, rødme
- Hævelse
- Blå mærker
- Blødning
- Kløe og udslæt

Det anbefales at du læser informationspjecen "Medicinsk kræftbehandling", som personalet kan udlevere til dig.

Ønsker du uddybende information, er du altid velkommen til at spørge personalet. Du kan også selv opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på www.indlaegsseddel.dk eller www.min.medicin.dk.

Efter behandlingen

De første dage efter behandlingen skal du holde øje med, om du får nogle af de tidligere nævnte behandlingsrelaterede reaktioner. Hvis du oplever dette, skal du straks kontakte afdelingen, som vil kunne hjælpe dig.

Kontakt ALTID afdelingen

Du skal altid kontakte afdelingen, hvis du oplever nedenstående problemer.

Du skal især være agtpågivende, hvis et problem opstår ret pludseligt og ikke tager af eller forsvinder af sig selv – hvis du oplever nogle gener, du ikke er vant til at have:

- Feber, 38°C eller derover
- Blødning, som ikke standser af sig selv
- Stærke smerter
- Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
- Åndenød eller stakåndethed
- Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
- Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre
- Udslæt
- Forstoppelse igennem flere dage
- Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
- Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
- Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
- Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme

Telefonnumre

Hæmatologisk Afdeling, hovednummer: 4732 4800, hverdage mellem 08.00-15.00

Hæmatologisk akuttelefon, Afsnit M: 4732 4886, mellem 15.00 og 08.00

Med venlig hilsen
Personalet
Hæmatologisk Afdeling

Version 3 Maj 22 Astu/Sare