

Privigen

Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Denne patientinformation er skrevet for at give en enkel orientering om behandlingen med Privigen (Immunglobulin).

Hvad er immunglobulin

I vores knoglemarv dannes de røde og hvide blodlegemer sammen med blodpladerne. Der findes flere forskellige typer af hvide blodlegemer. Den type, der laver immunglobulin, hedder plasmaceller. Immunglobulin kaldes også for antistoffer eller populært for gammaglobulin. Privigen er lavet på plasma tappet fra danske donorer.

Immunglobulinets funktion i kroppen

Immunglobulin deltager i kroppens forsvar mod sygdomme. Dette kaldes også immunforsvaret. Immunforsvaret genkender bakterier og lignende fremmedlegemer og sørger for at disse bliver ødelagt og udskilt fra kroppen.

Hvorfor gives Privigen?

Immunglobulin kan gives af mange forskellige årsager. Nedenunder er de mest almindelige nævnt. Spørg evt. sygeplejersken eller lægen, hvis du er i tvivl, om, hvorfor du er blevet tilbudt behandling med immunglobulin.

Sygdomme, der kan medføre lavt niveau af immunglobulin kan være:

- Leukæmi
- Myelomatose
- ITP
- CLL
- Eller anden årsag

Sådan gives Privigen

Behandling med Privigen bliver normalt givet ambulant. Det vil sige, at du går hjem samme dag.

Det bliver givet som en væske ind i en blodåre (infusion). Første gang tager behandlingen længere tid end de

efterfølgende gange, fordi stoffet kan give en allergisk reaktion. Sygeplejersken holder bl.a. øje med din temperatur, puls og blodtryk, for at se om du reagerer allergisk på behandlingen. En behandling varer nogle timer, men tiden kan variere fra person til person. Dette skyldes, at behandlingstiden er afhængig af flere forskellige faktorer

Inden infusionen:

- Sygeplejersken vil lægge en tynd plastikslange (perifert venekateter) ind i en blodåre på din ene arm.
- Medicinen gives via en medicinpumpe, der sikrer, at du får medicinen med den korrekte hastighed.
- Dit perifere venekateter bliver fjernet igen af sygeplejersken, inden du går hjem

Bivirkninger

Behandlingen med Privigen er som regel uden bivirkninger. Eventuelle bivirkninger er oftest milde og vil forsvinde efter kort tid. De ses mest ved de første infusioner.

Du kan få symptomer som:

- Kløe
- Snue
- Irritation i øjne og hals
- Udslæt
- Kvalme og opkastning
- Kulderystelser
- Åndenød
- Hjertebanken
- Fald i blodtrykket
- Influenzalignende symptomer som hovedpine, feber, smerter i ryg eller led

Kontakt ALTID afdelingen

Du skal altid kontakte afdelingen, hvis du oplever nedenstående problemer.
Du skal især være agtpågivende, hvis et problem opstår ret pludseligt og ikke tager af eller forsvinder af sig selv – hvis du oplever nogle gener, du ikke er vant til at have:

- Feber, 38°C eller derover
- Blødning, som ikke standser af sig selv
- Stærke smerter
- Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
- Åndenød eller stakåndethed
- Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
- Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre
- Udslæt
- Forstoppelse igennem flere dage
- Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
- Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
- Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
- Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme

Telefonnumre

Hæmatologisk Afdeling: 4732 4800, hverdage kl. 8.00-10.00

Hæmatologisk akuttelefon: kl. 10.00-8.00

Afsnit L : 4732 4858

Afsnit M : 4732 4886

Med venlig hilsen

Personalet

Hæmatologisk Afdeling