

Phimosis (forhudsforsnævring) - behandling med Diproderm

Børne- og Ungeafdelingen



REGION SJÆLLAND
HOLBÆK SYGEHUS



- vi er til for dig

Phimosi - forhudsfor snævring

Behandling af forhudsfor snævring

I skal anvende Diproderm creme 0,05 %. Cremen påsmøres 2 gange dagligt i 4 uger.

Forhuden strammes let op, så den forsnævrede del af forhuden ses tydeligt. Herefter påsmøres cremen i et tyndt lag fra spidsen af forhuden til der, hvor kanten af penishovedet tegnes gennem forhuden.

Efter 1 uges behandling, trækkes forhuden gradvist længere og længere tilbage. Dette skal ske minimum 2 gange dagligt.

Husk at forhuden altid skal trækkes tilbage på plads, så hævelse af penishovedet og forhuden undgås. Denne hævelse vil kunne hindre forhuden i at komme tilbage på plads.

Undgå at smøre creme på penishovedet eller på egne eller barnets fingre. Brug evt. handsker eller vask hænderne før og efter påsmøring.

Efter 4 ugers behandling skal resultatet vurderes.

Vi vil derfor bede jer kontakte sygeplejersken på tlf. 59 48 42 15 tast 3. Telefontid mandag-onsdag-torsdag-fredag mellem kl. 08.30-09.30, tirsdag 10-11.

Man kan behandle med creme i yderligere 4 uger eller såfremt forhuden stadig er generende snæver, vil jeres barn blive henvist til operation.



Hvorfor bruge binyrebarkhormoncreme?

Det er ved flere undersøgelser påvist, at man ved behandling med denne creme kan undgå operation hos drenge med forhudsfor snævring. 70-80 % opnår et tilfredsstillende resultat.

De samme undersøgelser har også vist, at der ikke er bivirkninger ved behandlingen. brugen af binyrebarkhormonet påvirker ikke børnenes egen hormonproduktion.



Holbæk Sygehus

Børne- og Ungeafdelingen

Smedelundsgade 60

4300 Holbæk

Tlf. 59 48 42 00