

Fjernelse af K-tråde hos børn



REGION SJÆLLAND
SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL



- vi er til for dig

Inden fjernelse af K-tråd

Vi anbefaler at barnet får Panodil ca. 1 time før mødetid.

Fjernelse af K-tråd kan foregå uden bedøvelse eller dit barn kan evt. få lattergas.

Efter fjernelse af K-trådene

Når dit barn har fået fjernet K-tråde og gips, varer det 2 - 4 uger inden armen har fået sin normale styrke og bevægelighed igen.

Dit barn skal forsøge at bruge armen normalt, men må ikke bære tunge ting, klatre i træer, dyrke sport og lignende i denne periode.

Dit barn bør ikke dyrke kontaktsport i 2 måneder efter fjernelse af K-tråd.

Karbad og pool: Først når såret er helet og skorper er faldet af.

Komplikationer

I tilfælde af

- Tiltagende smerter i hånden / armen.
- Hånden / armen bliver rød, varm, hævet.
- Temperatur over 38 gr.
- Såret væsker.

Skal du ringe på **tlf. 47 32 33 50**.

Tidsbestilling, afbud og spørgsmål

Tlf. 47 32 33 50 eller via »**Min Sundhedsplatform**«.

For at få adgang dit til barns ”Min Sundhedsplatform” skal du udfylde en aftaleerklæring – kan søges på Internettet og aflevere den til lægesekretær i afdelingen.